

# Avertissements agricoles



Bulletin technique n° 9 du 13 mai 1986  
(le bulletin n° 8 n'a été adressé qu'aux  
producteurs de blé du Bas-Rhin)

## ■ COLZA

**CHARANCON DES SILIQUES** : Localement de fortes infestations

**PUCERONS CENDRES** : lères colonies - Ne pas traiter

**SCLEROTINIA** : Protection encore possible dans les zones tardives

## ■ BLE

**MALADIES** : Attention à la septoriose !

## ■ ORGES D'HIVER - ESCOURGEONS

**RHYNCHOSPORIOSE - OIDIUM** : Maintenez la protection

## ■ BETTERAVES

**ATOMAIRES** : Dégâts importants dans certaines parcelles

**DESHERBAGE** : Nos conseils

## COLZA

### CHARANCON DES SILIQUES : LOCALEMENT DE FORTES INFESTATIONS

Cet insecte pond sur les jeunes siliques. L'orifice de ponte permet la ponte et les dégâts ultérieurs des cécidomyies.

#### → La situation

• **Localement de fortes infestations**, nettement supérieures à celles constatées au cours des années antérieures : ex. : à ROUFFACH, ALTKIRCH, ... ; Ces infestations ne sont toutefois pas généralisées à toutes les parcelles.

• **Nos dissections révèlent que la maturité de ponte des femelles est atteinte**; Cela marque le début de la période de risques.

### Produits utilisables

- alphaméthrine : Fastac : 0,2 l/ha
- bromophos : Nexion 25 : 2 l/ha  
Nexion 40 : 1,4 l/ha
- cyperméthrine : Nbx spécialités :  
25 g m.a./ha
- deltaméthrine : Décis : 0,2 l/ha
- dialiphos : Torak E : 1,25 l/ha
- endosulfan : Nbx spécialités :  
600 g m.a./ha
- fenvalérate : Sumicidin 10 : 0,4 l/ha
- phosalone : Azofène flo : 2,4 l/ha  
Zolone flo : 2,4 l/ha

### Nos conseils

- Intervenez rapidement en présence d'au moins 1 charançon pour 2 plantes
- Utilisez des produits non dangereux pour les abeilles et traitez en dehors des heures de butinage.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG  
Directeur-Gérant : D. CALLU

Publication Périodique  
CPPAP N° 1848 AD  
Abonnement Annuel : 130 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
D.R.A.F.  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
Cité Administrative  
67084 STRASBOURG CEDEX  
Tél. : 88.37.32.18  
Bas-Rhin : 88.69.65.89 - Haut-Rhin : 89.41.11.68



P 199

## **SCLEROTINIA : PROTECTION ENCORE POSSIBLE DANS LES ZONES TARDIVES**

Dans la majorité des situations, le traitement contre le sclérotinia a du déjà être réalisé.

→ **Seules les zones tardives** (ex.: SUNDGAU) **peuvent encore justifier une protection fongicide.**

Dans ces secteurs, au cas où l'on envisagerait de réaliser un mélange fongicide + insecticide, éviter d'employer SPOR-TAK PF en mélange avec un insecticide, en raison des risques de toxicité à l'égard des abeilles.

## **BLE**

### **MALADIES : ATTENTION A LA SEPTORIOSE**

#### ► La situation

→ Hormis quelques cas particuliers (semis très précoces avec précédent culturel "céréales à paille"), le piétin verse est limité.

→ **On assiste, par contre, à des sorties de taches de septoriose**, parfois même sur la 3e feuille en partant du haut de la plante. C'est le cas de 75 % des parcelles semées avant le 10 octobre.

→ L'oidium reste surtout localisé aux terres de Ried.

#### ► Nos conseils

Les conditions climatiques (alternance des périodes de chaleur et d'orages) étant extrêmement favorables à la septoriose, une protection fongicide est à envisager dès apparition des lères taches sur 3e feuille, soit très rapidement en situations précoces.

Pour le choix du produit, reportez-vous au tableau fongicide pages 3 et 4. Utilisez un produit efficace sur septoriose (parmi les parties 1 et 2 du tableau).

## **ORGES D'HIVER-ESCOURGEONS**

### **RHYNCHOSPORIOSE - OIDIUM : MAINTENEZ LA PROTECTION**

Développement important de ces deux maladies.

Renouvelez rapidement la protection dans les parcelles traitées depuis plus de 15 jours - 3 semaines.

## **BETTERAVES**

### **ATOMAIRES : DEGATS IMPORTANTS DANS CERTAINES PARCELLES**

En cas d'attaques, un traitement de rattrapage est possible avec :

- Sopragram : 3 l/ha - Paralindex : 4 l/ha  
- Kregan : 2,5 kg/ha - Lorsban : 2,5 kg.

### **DESHERBAGE : NOS CONSEILS**

Le stade du 1er traitement est proche : les dicotylédones devront être au stade cotylédons à 2 feuilles ; les graminées au stade 2 feuilles à début tallage ; le chiendent à 15 cm.

Pour améliorer efficacité et sélectivité, fractionner le traitement antidicotylédones avec un intervalle de 3 à 10 jours.

→ Les attaques de ravageurs souterrains risquent de sensibiliser les betteraves aux herbicides. Ne désherbez pas tant que les parcelles ne sont pas assainies.

★ 1er traitement : Bétanal (3 l) + Tramet (2,5 l) + Huile (2,5 l).

★ 2ème traitement : Bétanal (3 l) + Goltix (4 kg) ou Pyramine (4 l) ; ou mieux les deux produits associés 2 kg + 2 l ; + Huile (2,5 l).

Dans les situations à amarantes ou aethusa (faux persil), préférez Goltix.

→ Le développement des graminées justifie parfois l'adjonction de l'antigraminée dès le 1er traitement : Fervin ; Fervinal ; Fusilade X 2 ; Targa ; Gallant.



## FONGICIDES UTILISABLES SUR BLE ET ORGES

(d'après dépliant ITCF - février 1986)

B L E S					O R G E S				
PIETIN VERSE	OIDIUM	SEPTORIOSES	ROUILLE BRUNE	SPECIALITES COMMERCIALES	PIETIN VERSE	RHYNCHOS- PORIOSE	OIDIUM	ROUILLE NAINE	HELMINTHOS- PORIOSE (H.teres)
TRAITEMENT DU PIED, DES FEUILLES ET DES EPIS									
++ *	++	++	++ (1)	1. PUNCH C	++	++	++	++ (1)	++
++	++	++	++ (1)	TILT C	++	++	++	++ (1)	++
++	++	++	++ (1)	TILT SP	++	++	++	++ (1)	++
++	++	++	++ (1)	IMPACT R SOPRA	++	++	++	++ (1)	0
++	++	+	++ (1)	CORBEL DUO	++	++	++	++ (1)	0
++	++	+	++ (1)	CORVET CM	++	++	++	++ (1)	0
++	++	++	+ (1)	BAYLETON TRIPLE	++	++	0	+ (1)	0
			(1)	CORBEL TRIPLE				(1)	0
									0
++ *	+	++	0	2. SPORTAK 45	++ *	++	+	0	++
++ *	+	++	0	SPORTAK MZ	++ *	++	+	0	++
++ *	+	++	0	SPORTAK PF	++ *	++	+	0	++
++	+	++	0	BLEDOR 3 (PM ou Liquide)	++	++	+	0	0
++	+	++	0	VOLNEBE	++	++	+	0	0
++	+	++	0	BRAVO PLUS	++	++	+	0	0
++	+	++	0	CERECLAIR	++	++	+	0	0
++	+	+	0 (1)	BAVICAL F	++	++	+	0 (1)	0
++	+	+	0	CERETAL	++	++	0	0	0
++	+	+	0	EPIDOR P	++	+	0	0	0
++	+	+	0	KOMBAT	++	+	0	0	0
++	+	+	0	PELTAR	++	+	0	0	0
++	+	+	0	RIMIDINE PLUS	++	+	0	0	0
++	+	+	0	BRONX T	++	0	0	0	0
++	+	+	0	BAVISTINE M	++	0	0	0	0
++	+	+	0	BRONX	++	0	0	0	0
++	+	+	0	CARBENZIP M	++	0	0	0	0
++	+	+	0	DARYLINE M	++	0	0	0	0
			0	PREFONGIL			0	0	0
++	++	0	+	3. BAYLETON TOTAL	++	++	0	+	0
++	0	0	0	4. BAVISTINE FL	++	0	0	0	0
++	0	0	0	BENLATE	++	0	0	0	0
++	0	0	0	BRIOR FL	++	0	0	0	0
++	0	0	0	BRIOR	++	0	0	0	0
++	0	0	0	CARBENZIP FL	++	0	0	0	0
++	0	0	0	DARYLINE	++	0	0	0	0
++	0	0	0	DEROSAL L	++	0	0	0	0
++	0	0	0	DERROPRENE L	++	0	0	0	0
++	0	0	0	DILPEX	++	0	0	0	0
++	0	0	0	PIEDOR	++	0	0	0	0
++	0	0	0	SPRINT FL	++	0	0	0	0
++	0	0	0	TALNET	++	0	0	0	0

P 200



B L E S				O R G E S						
PIETIN VERSE	OIDIUM	SEPTORIOSES	ROUILLE BRUNE	SPECIALITES COMMERCIALES		PIETIN VERSE	RHYNCHOS- PORIOSE	OIDIUM	ROUILLE NAINE	HELMINTHOS- PORIOSE (H.teres)
TRAITEMENT DES FEUILLES ET DES EPIS										
0	++	++	++ (1)	5.	BAYFIDAN D	0	++	++	++	++
0	++	++	++ (1)		CORBEL STAR	0	++	++	++	0
0	++	++	++ (1)		IMPACT T SOPRA	0	++	++	++	
0	++	++	++ (1)		VIGIL T	0	++	++	++	0
0	++	++	++ (1)		TILT 125	0	+	++	++	++
0	++	++	++ (1)		TILT CT	0	0	0	0	0
0	++	0	++ (1)	6.	BAYFIDAN	0	0	++	++ (1)	0
0	++	0	++ (1)		CORBEL	0	0	++	++ (1)	0
0	++	0	++ (1)		IMPACT SOPRA	0	0	++	++ (1)	0
0	++	0	++ (1)		VIGIL	0	0	++	++ (1)	0
0	++	0	+ (1)		BAYLETON 25	0	0	++	+ (1)	0
0	+	0	0 (1)		CALIXINE	0	0	+	0 (1)	0
0	+	0	0 (1)		CALIXINE M	0	0	+	0 (1)	0
0	+	+	0	7.	SM 85 SCHERING	0	0	0	0	0
0	+	0	0	8.	ACTIOL	0	0	+	0	0
0	+	0	0		KUMULUS S	0	0	+	0	0
0	+	0	0		MICROTHIOL SP	0	0	+	0	0
0	+	0	0		OIDIASE	0	0	+	0	0
0	+	0	0		SAPROL PROCHIMAGRO	0	0	+	0	0
0	+	0	0		SODIL B	0	0	+	0	0
0	+	0	0		SOLFRAME	0	0	+	0	0
0	+	0	0		SULTOX SP FL	0	0	+	0	0
0	+	0	0		THIOVIT Microbilles	0	0	+	0	0
0	+	0	0		SOLFO CER	0	0	+	0	0
0	+	0	0		SOLFO LIQUIDE	0	0	0	0	0
0	+	0	0		TECHNO SOUFRE	0	0	0		
0	0	++	0	9.	DACONIL 2787W75	0	0	0	0	0
0	0	++	0		DACONIL 500 Flow	0	0	0	0	0
0	0	++	0		DITHANE LF	0	0	0	0	0
0	0	++	0		DITHANE M 45	0	0	0	0	0
0	0	++	0		FUNGISTOP FL	0	0	0	0	0
0	0	++	0		PENNZOZEB	0	0	0	0	0
0	0	++	0		SANDOZEBE	0	0	0	0	0
0	0	++	0		TRIZIMAN M	0	0	0	0	0
0	0		0		CALIDAN	0	0	0	0	0

## LEGENDE :

++	bonne efficacité
+	efficacité moyenne
0	non autorisé ou emploi déconseillé
	information insuffisante

- \* efficace sur piétin verse résistant aux BMC  
 (1) actif sur rouille jaune